

בתרון הקדמיה של ברוב המכסון מ 18/2/90

שאלה ב' ח אנשים, ג'נרם ח'ה ויואק, שאינם מכלים ז'ה את ז'ה, מטבילים קמגם.
 המגם נחנק גש' מקומות אקראיים וכן נולדים שני המגם'ים חזשים.
 א. חזק את ההסתברות שח'ה ויואק נמ'אים באותו מגם חזש. נסח פתוח'ק.
 ב. חזק את תוחלת מסר האנשים המגם שמי'ם את ח'ה. מהו סגור האנשים
 האל'ה מתק כל'ם ח האנשים עקור ח גזום ?
 ג. חזק את תוחלת מסר האנשים המגם האוק, פ'מכסמ'ל, מהו סגור האנשים
 האל'ה מתק כל'ם ח האנשים עקור ח גזום ?

פתרון: א. נניח שמגם'ים יש ל'חות 4 אנשים וסל'ם המגם שנו'ה יש ל'חות 2.

יש $\binom{h-3}{2}$ אפשרויות עקור מ'צות. יואק נמ'ל בהחוק X מ'י'ן ח'ה כל'ם
 $(1-h, 1) \sim U \cdot X$. אם יואק נמ'ל בהחוק A מ'י'ן ח'ה אז ג'ל'ם סל'ם המגם י'ו
 ל'חות 2 אז מסר האפשרויות שיה' י'כזו פ'ל $2-k(h-k)$

$$P = 1 - \frac{1}{h-1} \sum_{k=1}^{h-1} \frac{k(h-k)-2}{h(h-3)/2} = \dots$$

ל'תק סל'ם ה'אור $\sum_{k=2}^h \binom{k}{2} = \binom{h+1}{2+1}$ נ'תן ל'ת'ר ג'פ'ות

ג. ח'ה קוז'ל ת'פ'ה המגם שמי'ם א'ת'ה. כל א'וז מהא'לים י'פ'ה
 המגם שמי'ם א'ת'ה ג'הסתברות ק. ל'ן ה'תחלת פ'ל ק $(1-h) + 1$.
 כל'ם $\infty \rightarrow h$ ת'ש'ל' הפ'רופור'יה פ'תמ'צ'ת של מסר האנשים

שמגם'ים של ח'ה ל' $\frac{2}{3}$.

ד. X- מסר האנשים המגם פ'מכסמ'ל.

עקור ח על'י: $P(X \geq k) = 1$ עקור $k \leq \frac{h}{2}$, $P(X \geq \frac{h}{2} + 1) = \frac{h-4}{h-3}$

עקור $h/2 + 3 \leq k \leq h-2$ $P(X \geq k) = \frac{h-4-2(k-h/2-1)}{h-3}$


עקור $k \leq \frac{h+1}{2}$ $P(X \geq k) = 1$

עקור $\frac{h+1}{2} \leq k \leq h-2$ $P(X \geq k) = \frac{h-3-2(k-\frac{h+1}{2})}{h-3}$

ג'ל'ם א'וז מהמק'לים $E(X) = \sum_{k=1}^{h-2} P(X \geq k)$. גש' המק'לים ת'ש'ל' הפ'רופור'יה
 פ'תמ'צ'ת ל' $\frac{3}{4}$ כל'ם $\infty \rightarrow h$. (ל'מכסמ'ל'ה ה'ת'בל'ת צ'ומ'ה ל')

$(U(h/2, h-2))$

אלה: (מבחנה של ברוב מלכסון $n=90/2=45$)



אחד מעשרת הכבדים שבתמונה נבחר באקראי. יב' X המספר הכתוב עליו.
 הכבד מוחזר למטל ממנו הוא בא, וממנו לבד נבחרים באקראי שני כבדים
 נוספים, עם החזרה. יב' Y ו- Z המספרים הכתובים עליהם.
 א. מצא את ההתפלגות המשותפת של X ו- Y והדבר באותה המותנה
 של Y קבועת ערכי X .
 ב. מצא את ההתפלגות המשותפת של X קבועת ערכי Y .
 ג. חשב את הסכי' לכך e Y ו- Z יקראו אותו ערך מסביר.

בתורן: $P(X=1, Y=1) = 0.1 + 0.1 \cdot \frac{1}{2} + 0.1 \cdot \frac{1}{3} + 0.1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{25}{120}$ א.

$P(X=1, Y=2) = 0.1 \cdot \frac{1}{2} + 0.1 \cdot \frac{2}{3} + 0.1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{23}{120}$

$P(X=2, Y=1) = 0.1 \cdot \frac{1}{2} + 0.2 \cdot \frac{1}{3} + 0.3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{23}{120}$

$P(X=2, Y=2) = 0.1 \cdot \frac{1}{2} + 0.2 \cdot \frac{2}{3} + 0.3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{49}{120}$

$P(Y=1|X=1) = \frac{25}{25+23}$ $P(Y=2|X=1) = \frac{23}{25+23}$
 $P(Y=1|X=2) = \frac{23}{23+49}$ $P(Y=2|X=2) = \frac{49}{23+49}$

$E(X|Y=1) = \frac{25}{25+23} \cdot 1 + \frac{23}{25+23} \cdot 2$ $E(X|Y=2) = \frac{23}{23+49} \cdot 1 + \frac{49}{23+49} \cdot 2$ ב.

$0.1 + 0.2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) + 0.3 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \right) +$
 $+ 0.4 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \right)$ ג.

עמ' 1

שאלה: (מחנה של ברוב מלכסון מ 18/2/90)
 'י' $X \sim \text{Pois}(\lambda)$. א. עבור $t \neq 0$ חשב, חשב $\frac{e^{-\lambda} \lambda^N}{N!} \leq P(X \geq N) \leq \frac{e^{-\lambda} \lambda^N}{(N/e)^N}$, $N \geq 0$ ה. הוכח שכל $N \geq 0$

(הצגה: גטא) $P(X \geq N) = P(e^{tX} \geq e^{tN})$ והפעם חלק כל' בתיון: א.

$$E(e^{tX}) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) \cdot e^{tk} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \cdot e^{tk} =$$

$$= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^t} = e^{-\lambda(1-e^t)}$$

ה. הוכח השאלה מתקנה מהטעון $P(X \geq N) \geq P(X=N)$. שג' הוכח ה'מנ':
 e^{tX} היא פונקציה מונוטונית עולה? X עבור כל t חיובי.

היא גם חיובי. עבור $t \geq 0$:
 $P(X \geq N) \leq \frac{e^{-\lambda(1-e^t)}}{e^{tN}} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^t - tN}$
 נבדוק עבור איזה t מתקדם חסר הבדק ביותר; נחפש את המינימום של $f(t) = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^t - tN}$. המינימום מתקדם בקצב $t = \ln\left(\frac{N}{\lambda}\right)$ זהו מתקדם חסר נכנס.

שאלה: (מחנה של ברוב מלכסון מ 18/2/90)

'י' X משתנה מקרי, הנתן צרכים ט'צ"ים, תוחמת M ושונות σ^2 סבבים ונתן בהתבססות המותנה של משתנה מקרי Y בהנתן $X=x$ (עבור אטקצו כלשהו) דינמית $B(x, p)$. א. גטא את $E(Y)$ ואת $V(Y)$ גרצית p, σ, M .
 ה. הוכח מתבסס $Y \sim \text{Pois}(\lambda)$.

בתיון: א. $E(Y) = M \cdot p$

$$V(Y) = E(V(Y|X)) + V(E(Y|X)) = M \cdot p \cdot (1-p) + \sigma^2 \cdot p^2$$

$$P(Y=k) = \sum_{m=k}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^m}{m!} \cdot \binom{m}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{m-k} =$$

$$= \frac{(\lambda p)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \sum_{m=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{m-k}}{(m-k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda(1-p)} = \frac{e^{-\lambda p} (\lambda p)^k}{k!}$$

$\implies Y \sim \text{Pois}(\lambda p)$

אלורה: (מחזור של ברוב מוסכסון מ 18/2/90)
 א. תן ציגול סהיבסלס של משיגה מקרי X עקרו $P(|X - E(X)| \geq 3 \cdot \sigma(X))$

ב. תן ציגול סהיבסלס של משיגה מקרי עם תוסלת 4, חזיון 3 וסטיתיון 2.
 ג. תן ציגול סהיבסלס של משיגה מקרי X ובוטקיה f כק סקנס הפוסל קין X ו f(x)

בתינו: $P(X=0) = \frac{8}{9}$, $P(X=3) = P(X=-3) = \frac{1}{18}$, $k = -0.6$

$P(Y=0) = 1-a$, $P(Y=k) = a$, $Z \equiv 3$, $X = Y + Z$.?
 $\begin{cases} a \cdot k = 1 \\ a \cdot k^2 \cdot (1-a) = 4 \end{cases}$, $\sigma^2 = k^2 \cdot a \cdot (1+a)$, $E(Y) = a \cdot k$

מסקנה $P(X=8) = 0.2$, $P(X=3) = 0.8$! $a = 0.2$, $k = 5$

$P(X=1) = P(X=-1) = P(X=t) = P(X=-t) = \frac{1}{4}$.c

$f(1) = -1$, $f(-1) = 1$, $f(t) = t$, $f(-t) = -t$

$E(X) = E(f(X)) = 0$, $V(X) = V(f(X)) = 0.5 + 0.5 \cdot t^2$

$E(X \cdot f(X)) = 0.5 \cdot 1 \cdot (-1) + 0.5 \cdot t^2 = 0.5 \cdot t^2 - 0.5$

$\frac{0.5 \cdot t^2 - 0.5}{0.5 \cdot t^2 + 0.5} = -0.6 \implies t = 0.5$

אלורה: (מחזור של ברוב מוסכסון מ 18/2/90)

יבול X_1, X_2, \dots, X_n גלתי תלוים , $V(X_i) = 1$ לכל $1 \leq i \leq n$.
 א. יבול $X_i = X + X_j$, $1 \leq i \leq n$, הסיבוב $\rho(X_i, X_j)$ אינו תלוי ב- i או j ?
 אם כן , ויכיל סקרה ערק כספיו קלטס הפתוח $(0, 1)$.

ב. הסיבוב סלס $V(Z_j) = 1$! $\rho(Z_i, Z_j)$ אינו תלוי ב- i או j בתחום $1 \leq i < j \leq n$,
 אק ערכו סלסי, חל סל יכיל סלרות גבלס כביטט. חוסל אלוט כבוטקיה של מקנס הפוסל.

בתינו: א. $\rho(X_i, X_j) = \frac{\text{cov}(X + X_i, X + X_j)}{\sqrt{V(X + X_i) \cdot V(X + X_j)}} = \frac{V(X)}{V(X) + 1}$

עקור מקנס מוסלס $r \cdot (V(X) + 1) = V(X) \implies V(X) = \frac{1}{1-r}$

$\rho(Z_i, Z_j) = \frac{\text{cov}(Z_i, Z_j)}{\sqrt{1 \cdot 1}} = \text{cov}(Z_1, Z_2)$.?

$0 \leq V\left(\sum_{i=1}^n Z_i\right) = n \cdot V(Z_1) + n \cdot (n-1) \cdot \text{cov}(Z_1, Z_2) \implies$

$n \cdot 1 + n(n-1) \cdot \rho(Z_1, Z_2) \geq 0 \implies \rho(Z_1, Z_2) \geq -\frac{1}{n-1} \implies \rho \leq 1 - \frac{1}{\rho(Z_1, Z_2)}$